

表 1596 喫煙の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

| HDL-C濃度     | 現在吸っていない          | 現在吸っている          | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 20未満<br>(%) | 551<br>(88.0)     | 75<br>(12.0)     | 626<br>(100.0)     | 57     | 113    | 796     |
| 20～<br>(%)  | 10,654<br>(85.3)  | 1,837<br>(14.7)  | 12,491<br>(100.0)  | 813    | 2,319  | 15,623  |
| 30～<br>(%)  | 31,529<br>(86.1)  | 5,099<br>(13.9)  | 36,628<br>(100.0)  | 2,439  | 6,780  | 45,847  |
| 40～<br>(%)  | 35,832<br>(87.4)  | 5,143<br>(12.6)  | 40,975<br>(100.0)  | 2,670  | 7,707  | 51,352  |
| 50～<br>(%)  | 26,252<br>(88.1)  | 3,530<br>(11.9)  | 29,782<br>(100.0)  | 2,034  | 5,745  | 37,561  |
| 60～<br>(%)  | 15,716<br>(89.0)  | 1,941<br>(11.0)  | 17,657<br>(100.0)  | 1,233  | 3,346  | 22,236  |
| 70～<br>(%)  | 7,693<br>(88.8)   | 975<br>(11.2)    | 8,668<br>(100.0)   | 588    | 1,736  | 10,992  |
| 80～<br>(%)  | 3,668<br>(89.5)   | 432<br>(10.5)    | 4,100<br>(100.0)   | 299    | 830    | 5,229   |
| 90～<br>(%)  | 1,612<br>(89.1)   | 197<br>(10.9)    | 1,809<br>(100.0)   | 131    | 391    | 2,331   |
| 100～<br>(%) | 1,303<br>(87.7)   | 183<br>(12.3)    | 1,486<br>(100.0)   | 116    | 399    | 2,001   |
| 合計<br>(%)   | 134,810<br>(87.4) | 19,412<br>(12.6) | 154,222<br>(100.0) | 10,380 | 29,366 | 193,968 |
| 記載なし<br>(%) | 59,970<br>(88.9)  | 7,464<br>(11.1)  | 67,434<br>(100.0)  | 6,449  | 42,257 | 116,140 |
| 総計<br>(%)   | 194,780<br>(87.9) | 26,876<br>(12.1) | 221,656<br>(100.0) | 16,829 | 71,623 | 310,108 |
| 平均          | 48.81             | 47.27            | 48.62              | 49.03  | 49.33  | 48.75   |
| 標準偏差        | 16.58             | 16.35            | 16.56              | 16.91  | 17.37  | 16.71   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査