

表 1597 喫煙の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

Non-HDL-C濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	2,286 (85.0)	402 (15.0)	2,688 (100.0)	190	532	3,410
50～ (%)	10,871 (85.2)	1,883 (14.8)	12,754 (100.0)	880	2,467	16,101
70～ (%)	24,404 (86.6)	3,766 (13.4)	28,170 (100.0)	1,907	5,492	35,569
90～ (%)	29,594 (87.5)	4,209 (12.5)	33,803 (100.0)	2,160	6,415	42,378
110～ (%)	24,113 (87.8)	3,352 (12.2)	27,465 (100.0)	1,658	5,080	34,203
130～ (%)	14,787 (88.4)	1,936 (11.6)	16,723 (100.0)	1,047	3,193	20,963
150～ (%)	7,464 (88.8)	944 (11.2)	8,408 (100.0)	563	1,619	10,590
170～ (%)	3,349 (88.2)	449 (11.8)	3,798 (100.0)	246	678	4,722
190～ (%)	1,273 (87.6)	181 (12.4)	1,454 (100.0)	96	259	1,809
210～ (%)	748 (87.6)	106 (12.4)	854 (100.0)	56	214	1,124
合計 (%)	118,889 (87.3)	17,228 (12.7)	136,117 (100.0)	8,803	25,949	170,869
記載なし (%)	75,891 (88.7)	9,648 (11.3)	85,539 (100.0)	8,026	45,674	139,239
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	107.47	104.97	107.15	106.29	106.97	107.08
標準偏差	33.48	33.72	33.52	33.85	33.98	33.61

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査