

表 1598 喫煙の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮期血圧	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	30 (93.8)	2 (6.3)	32 (100.0)	2	6	40
60～ (%)	320 (94.4)	19 (5.6)	339 (100.0)	26	68	433
80～ (%)	2,434 (92.7)	192 (7.3)	2,626 (100.0)	191	521	3,338
100～ (%)	12,831 (91.5)	1,185 (8.5)	14,016 (100.0)	967	2,624	17,607
120～ (%)	38,127 (89.9)	4,281 (10.1)	42,408 (100.0)	2,904	7,959	53,271
140～ (%)	56,241 (88.0)	7,661 (12.0)	63,902 (100.0)	4,667	12,253	80,822
160～ (%)	39,399 (86.1)	6,354 (13.9)	45,753 (100.0)	3,428	9,014	58,195
180～ (%)	14,679 (83.8)	2,835 (16.2)	17,514 (100.0)	1,311	3,399	22,224
200～ (%)	3,554 (82.1)	774 (17.9)	4,328 (100.0)	358	860	5,546
220～ (%)	757 (83.6)	149 (16.4)	906 (100.0)	74	180	1,160
合計 (%)	168,372 (87.8)	23,452 (12.2)	191,824 (100.0)	13,928	36,884	242,636
記載なし (%)	26,408 (88.5)	3,424 (11.5)	29,832 (100.0)	2,901	34,739	67,472
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	150.35	155.71	151.00	151.97	151.45	151.13
標準偏差	24.17	24.05	24.22	24.28	24.26	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査