

表 1599 喫煙の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前拡張 期血圧	現在吸ってい ない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	54 (87.1)	8 (12.9)	62 (100.0)	4	14	80
20～ (%)	561 (91.7)	51 (8.3)	612 (100.0)	55	129	796
40～ (%)	14,978 (92.5)	1,209 (7.5)	16,187 (100.0)	1,087	3,206	20,480
60～ (%)	79,759 (89.9)	8,983 (10.1)	88,742 (100.0)	6,171	16,965	111,878
80～ (%)	40,840 (86.5)	6,364 (13.5)	47,204 (100.0)	3,489	8,994	59,687
90～ (%)	21,146 (83.7)	4,119 (16.3)	25,265 (100.0)	2,072	4,914	32,251
100～ (%)	9,958 (80.3)	2,438 (19.7)	12,396 (100.0)	973	2,402	15,771
120～ (%)	559 (75.4)	182 (24.6)	741 (100.0)	70	153	964
140～ (%)	43 (74.1)	15 (25.9)	58 (100.0)	3	14	75
合計 (%)	167,898 (87.8)	23,369 (12.2)	191,267 (100.0)	13,924	36,791	241,982
記載なし (%)	26,882 (88.5)	3,507 (11.5)	30,389 (100.0)	2,905	34,832	68,126
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	77.16	81.67	77.71	78.64	77.77	77.77
標準偏差	14.27	14.73	14.41	14.62	14.58	14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査