

表 1600 喫煙の有無 透析前脈拍(拍/分)別 (透析患者全体)

透析前脈拍	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)	137 (93.8)	9 (6.2)	146 (100.0)	8	31	185
40～ (%)	1,720 (91.7)	155 (8.3)	1,875 (100.0)	157	349	2,381
50～ (%)	14,186 (91.3)	1,349 (8.7)	15,535 (100.0)	1,104	2,873	19,512
60～ (%)	43,565 (89.8)	4,965 (10.2)	48,530 (100.0)	3,163	9,088	60,781
70～ (%)	51,272 (87.9)	7,044 (12.1)	58,316 (100.0)	3,900	11,056	73,272
80～ (%)	31,730 (86.0)	5,162 (14.0)	36,892 (100.0)	2,481	7,441	46,814
90～ (%)	13,629 (83.4)	2,711 (16.6)	16,340 (100.0)	1,082	3,168	20,590
100～ (%)	4,186 (82.7)	878 (17.3)	5,064 (100.0)	399	930	6,393
110～ (%)	1,049 (85.8)	174 (14.2)	1,223 (100.0)	83	222	1,528
120～ (%)	442 (86.2)	71 (13.8)	513 (100.0)	55	87	655
合計 (%)	161,916 (87.8)	22,518 (12.2)	184,434 (100.0)	12,432	35,245	232,111
記載なし (%)	32,864 (88.3)	4,358 (11.7)	37,222 (100.0)	4,397	36,378	77,997
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	74.31	77.08	74.65	74.76	74.86	74.69
標準偏差	12.77	13.03	12.83	13.26	12.70	12.84

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査