

表 1603 喫煙の有無 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	34,340	4,488	38,828	3,256	8,631	50,715
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
2年～	39,082	5,630	44,712	3,258	10,319	58,289
(%)	(87.4)	(12.6)	(100.0)			
5年～	39,895	6,015	45,910	3,273	10,044	59,227
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
10年～	20,571	2,703	23,274	1,603	5,155	30,032
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
15年～	10,464	1,364	11,828	834	2,587	15,249
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
20年～	5,553	688	6,241	422	1,268	7,931
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
25年～	2,851	308	3,159	205	680	4,044
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
30年～	1,576	153	1,729	96	358	2,183
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
35年～	762	74	836	40	157	1,033
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
40年～	163	8	171	16	34	221
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
合計	155,257	21,431	176,688	13,003	39,233	228,924
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
不明	18	2	20	4	23	47
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	155,275	21,433	176,708	13,007	39,256	228,971
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
平均	7.07	6.74	7.03	6.57	6.87	6.98
標準偏差	7.14	6.61	7.08	6.82	6.92	7.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査