

表 1604 喫煙の有無 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	47,288	5,661	52,949	3,887	11,741	68,577
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	1,572	166	1,738	91	336	2,165
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	1,322	141	1,463	86	285	1,834
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	805	41	846	34	184	1,064
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	625	75	700	52	197	949
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	5,773	580	6,353	457	1,388	8,198
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
腎硬化症	15,214	1,692	16,906	1,182	3,372	21,460
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
悪性高血圧	1,215	245	1,460	94	327	1,881
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	59,509	10,047	69,556	5,239	15,712	90,507
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
SLE腎炎	1,073	125	1,198	100	252	1,550
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
アミロイド腎	227	15	242	14	69	325
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
痛風腎	543	114	657	47	124	828
(%)	(82.6)	(17.4)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	122	19	141	11	25	177
(%)	(86.5)	(13.5)	(100.0)			
腎・尿路結核	110	12	122	7	29	158
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
腎・尿路結石	290	46	336	24	70	430
(%)	(86.3)	(13.7)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	469	62	531	36	119	686
(%)	(88.3)	(11.7)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	374	54	428	22	67	517
(%)	(87.4)	(12.6)	(100.0)			
骨髄腫	147	11	158	10	22	190
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
腎形成不全	301	39	340	18	61	419
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
不明	13,611	1,682	15,293	1,153	3,679	20,125
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
再導入	945	152	1,097	77	243	1,417
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
その他	3,740	454	4,194	366	954	5,514
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
合計	155,275	21,433	176,708	13,007	39,256	228,971
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	155,275	21,433	176,708	13,007	39,256	228,971
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査