

表 1608 喫煙の有無 透析時間(時間/回)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析時間	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満 (%)	357 (91.8)	32 (8.2)	389 (100.0)	38	94	521
3.0～ (%)	16,933 (91.3)	1,611 (8.7)	18,544 (100.0)	1,576	4,700	24,820
3.5～ (%)	12,239 (89.9)	1,381 (10.1)	13,620 (100.0)	973	3,346	17,939
4.0～ (%)	105,589 (87.7)	14,766 (12.3)	120,355 (100.0)	8,647	25,996	154,998
4.5～ (%)	7,871 (84.9)	1,396 (15.1)	9,267 (100.0)	615	1,796	11,678
5.0～ (%)	10,532 (84.3)	1,965 (15.7)	12,497 (100.0)	930	2,160	15,587
5.5～ (%)	435 (85.6)	73 (14.4)	508 (100.0)	23	64	595
6.0～ (%)	684 (83.9)	131 (16.1)	815 (100.0)	73	106	994
6.5～ (%)	25 (69.4)	11 (30.6)	36 (100.0)	16	6	58
7.0～ (%)	263 (87.7)	37 (12.3)	300 (100.0)	74	137	511
合計 (%)	154,928 (87.9)	21,403 (12.1)	176,331 (100.0)	12,965	38,405	227,701
記載なし (%)	347 (92.0)	30 (8.0)	377 (100.0)	42	851	1,270
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	3.97	4.05	3.98	3.98	3.95	3.97
標準偏差	0.51	0.51	0.52	0.58	0.53	0.52

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査