

表 1610 喫煙の有無 身長(cm)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

身長	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
130未満	188	10	198	16	23	237
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
130～	463	4	467	31	70	568
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
135～	1,860	49	1,909	96	300	2,305
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
140～	6,629	166	6,795	354	1,134	8,283
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
145～	14,772	599	15,371	843	2,605	18,819
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
150～	22,709	1,488	24,197	1,426	4,391	30,014
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
155～	25,401	2,670	28,071	1,782	5,004	34,857
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
160～	29,186	4,608	33,794	2,255	6,209	42,258
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
165～	24,840	5,213	30,053	2,065	5,458	37,576
(%)	(82.7)	(17.3)	(100.0)			
170～	15,025	3,871	18,896	1,386	3,545	23,827
(%)	(79.5)	(20.5)	(100.0)			
175～	5,260	1,562	6,822	474	1,253	8,549
(%)	(77.1)	(22.9)	(100.0)			
180～	1,308	481	1,789	150	315	2,254
(%)	(73.1)	(26.9)	(100.0)			
185～	203	80	283	20	48	351
(%)	(71.7)	(28.3)	(100.0)			
190～	34	9	43	4	10	57
(%)	(79.1)	(20.9)	(100.0)			
合計	147,878	20,810	168,688	10,902	30,365	209,955
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
記載なし	7,397	623	8,020	2,105	8,891	19,016
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
総計	155,275	21,433	176,708	13,007	39,256	228,971
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
平均	159.19	164.64	159.86	160.74	160.11	159.94
標準偏差	9.60	8.21	9.61	9.50	9.49	9.59

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査