

表 1612 喫煙の有無 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	511 (88.1)	69 (11.9)	580 (100.0)	42	133	755
0.0～ (%)	6,087 (92.1)	523 (7.9)	6,610 (100.0)	473	1,367	8,450
1.0～ (%)	29,693 (92.3)	2,476 (7.7)	32,169 (100.0)	2,261	6,595	41,025
2.0～ (%)	51,635 (89.5)	6,034 (10.5)	57,669 (100.0)	3,755	11,737	73,161
3.0～ (%)	24,780 (82.7)	5,192 (17.3)	29,972 (100.0)	2,107	6,031	38,110
4.0～ (%)	5,485 (74.4)	1,890 (25.6)	7,375 (100.0)	522	1,548	9,445
5.0～ (%)	1,078 (70.2)	458 (29.8)	1,536 (100.0)	97	325	1,958
6.0～ (%)	206 (66.0)	106 (34.0)	312 (100.0)	18	65	395
7.0～ (%)	53 (70.7)	22 (29.3)	75 (100.0)	5	15	95
8.0～ (%)	112 (86.8)	17 (13.2)	129 (100.0)	9	22	160
合計 (%)	119,640 (87.7)	16,787 (12.3)	136,427 (100.0)	9,289	27,838	173,554
記載なし (%)	1,277 (89.1)	156 (10.9)	1,433 (100.0)	458	2,764	4,655
総計 (%)	120,917 (87.7)	16,943 (12.3)	137,860 (100.0)	9,747	30,602	178,209
平均	2.43	2.88	2.49	2.48	2.48	2.49
標準偏差	1.03	1.15	1.05	1.07	1.04	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査