

表 1613 喫煙の有無 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	2,579 (89.7)	295 (10.3)	2,874 (100.0)	233	589	3,696
1.0～ (%)	4,624 (90.4)	491 (9.6)	5,115 (100.0)	379	1,115	6,609
2.0～ (%)	11,837 (90.0)	1,317 (10.0)	13,154 (100.0)	980	2,787	16,921
3.0～ (%)	24,327 (89.4)	2,893 (10.6)	27,220 (100.0)	1,859	5,505	34,584
4.0～ (%)	32,167 (88.3)	4,275 (11.7)	36,442 (100.0)	2,534	7,439	46,415
5.0～ (%)	24,793 (86.5)	3,854 (13.5)	28,647 (100.0)	1,891	5,751	36,289
6.0～ (%)	12,386 (85.0)	2,185 (15.0)	14,571 (100.0)	911	2,945	18,427
7.0～ (%)	4,699 (83.3)	939 (16.7)	5,638 (100.0)	325	1,145	7,108
8.0～ (%)	1,392 (80.2)	344 (19.8)	1,736 (100.0)	113	346	2,195
9.0～ (%)	760 (80.3)	186 (19.7)	946 (100.0)	58	201	1,205
合計 (%)	119,564 (87.7)	16,779 (12.3)	136,343 (100.0)	9,283	27,823	173,449
記載なし (%)	1,353 (89.2)	164 (10.8)	1,517 (100.0)	464	2,779	4,760
総計 (%)	120,917 (87.7)	16,943 (12.3)	137,860 (100.0)	9,747	30,602	178,209
平均	4.50	4.81	4.54	4.44	4.52	4.53
標準偏差	1.64	1.70	1.65	1.64	1.66	1.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査