

表 1614 喫煙の有無 Body Mass Index別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| Body Mass Index | 現在吸っていない          | 現在吸っている          | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 14未満<br>(%)     | 994<br>(94.4)     | 59<br>(5.6)      | 1,053<br>(100.0)   | 63     | 195    | 1,311   |
| 14～<br>(%)      | 5,805<br>(92.9)   | 445<br>(7.1)     | 6,250<br>(100.0)   | 355    | 1,001  | 7,606   |
| 16～<br>(%)      | 18,147<br>(91.0)  | 1,798<br>(9.0)   | 19,945<br>(100.0)  | 1,148  | 3,387  | 24,480  |
| 18～<br>(%)      | 31,002<br>(88.9)  | 3,853<br>(11.1)  | 34,855<br>(100.0)  | 2,206  | 6,095  | 43,156  |
| 20～<br>(%)      | 33,750<br>(87.6)  | 4,757<br>(12.4)  | 38,507<br>(100.0)  | 2,446  | 6,727  | 47,680  |
| 22～<br>(%)      | 25,717<br>(86.8)  | 3,897<br>(13.2)  | 29,614<br>(100.0)  | 1,963  | 5,233  | 36,810  |
| 24～<br>(%)      | 15,059<br>(85.4)  | 2,584<br>(14.6)  | 17,643<br>(100.0)  | 1,162  | 3,108  | 21,913  |
| 26～<br>(%)      | 7,806<br>(83.8)   | 1,513<br>(16.2)  | 9,319<br>(100.0)   | 651    | 1,718  | 11,688  |
| 28～<br>(%)      | 4,083<br>(84.3)   | 759<br>(15.7)    | 4,842<br>(100.0)   | 320    | 829    | 5,991   |
| 30～<br>(%)      | 3,389<br>(81.1)   | 791<br>(18.9)    | 4,180<br>(100.0)   | 294    | 690    | 5,164   |
| 合計<br>(%)       | 145,752<br>(87.7) | 20,456<br>(12.3) | 166,208<br>(100.0) | 10,608 | 28,983 | 205,799 |
| 記載なし<br>(%)     | 9,523<br>(90.7)   | 977<br>(9.3)     | 10,500<br>(100.0)  | 2,399  | 10,273 | 23,172  |
| 総計<br>(%)       | 155,275<br>(87.9) | 21,433<br>(12.1) | 176,708<br>(100.0) | 13,007 | 39,256 | 228,971 |
| 平均              | 21.35             | 22.16            | 21.45              | 21.62  | 21.48  | 21.46   |
| 標準偏差            | 3.64              | 3.73             | 3.66               | 3.67   | 3.63   | 3.66    |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査