

表 1615 喫煙の有無 透析前BUN(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満	334	42	376	26	77	479
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
20～	1,775	188	1,963	127	390	2,480
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
30～	7,124	1,011	8,135	527	1,696	10,358
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
40～	18,479	2,803	21,282	1,303	4,226	26,811
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
50～	29,452	4,119	33,571	2,189	6,899	42,659
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
60～	29,516	4,039	33,555	2,276	6,812	42,643
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
70～	19,611	2,665	22,276	1,594	4,452	28,322
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
80～	9,031	1,279	10,310	793	2,109	13,212
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
90～	3,293	458	3,751	309	743	4,803
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
100～	907	150	1,057	86	205	1,348
(%)	(85.8)	(14.2)	(100.0)			
110～	269	41	310	21	63	394
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
120～	134	23	157	18	29	204
(%)	(85.4)	(14.6)	(100.0)			
合計	119,925	16,818	136,743	9,269	27,701	173,713
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
記載なし	992	125	1,117	478	2,901	4,496
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
総計	120,917	16,943	137,860	9,747	30,602	178,209
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	60.90	60.80	60.89	61.99	60.84	60.94
標準偏差	15.61	15.61	15.61	16.12	15.59	15.64

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査