

表 1616 喫煙の有無 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	52 (92.9)	4 (7.1)	56 (100.0)	6	14	76
2～ (%)	1,251 (95.9)	53 (4.1)	1,304 (100.0)	82	270	1,656
4～ (%)	5,881 (95.5)	274 (4.5)	6,155 (100.0)	408	1,232	7,795
6～ (%)	17,664 (93.0)	1,320 (7.0)	18,984 (100.0)	1,198	3,824	24,006
8～ (%)	32,940 (90.0)	3,643 (10.0)	36,583 (100.0)	2,348	7,184	46,115
10～ (%)	32,824 (86.9)	4,957 (13.1)	37,781 (100.0)	2,526	7,727	48,034
12～ (%)	19,319 (82.8)	4,009 (17.2)	23,328 (100.0)	1,700	4,726	29,754
14～ (%)	7,451 (79.7)	1,899 (20.3)	9,350 (100.0)	732	1,954	12,036
16～ (%)	2,529 (79.4)	658 (20.6)	3,187 (100.0)	267	646	4,100
合計 (%)	119,911 (87.7)	16,817 (12.3)	136,728 (100.0)	9,267	27,577	173,572
記載なし (%)	1,006 (88.9)	126 (11.1)	1,132 (100.0)	480	3,025	4,637
総計 (%)	120,917 (87.7)	16,943 (12.3)	137,860 (100.0)	9,747	30,602	178,209
平均	10.14	11.27	10.28	10.45	10.31	10.29
標準偏差	2.77	2.66	2.78	2.83	2.81	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査