

表 1618 喫煙の有無 equilibrated Kt/V(eKt/V)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

equilibrated Kt/V (eKt/V)	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	92 (89.3)	11 (10.7)	103 (100.0)	15	16	134
0.4～ (%)	259 (87.5)	37 (12.5)	296 (100.0)	28	42	366
0.6～ (%)	1,924 (87.8)	268 (12.2)	2,192 (100.0)	195	451	2,838
0.8～ (%)	10,053 (84.9)	1,789 (15.1)	11,842 (100.0)	837	2,361	15,040
1.0～ (%)	28,419 (85.3)	4,890 (14.7)	33,309 (100.0)	2,299	6,787	42,395
1.2～ (%)	35,709 (87.2)	5,263 (12.8)	40,972 (100.0)	2,712	8,084	51,768
1.4～ (%)	22,497 (90.2)	2,446 (9.8)	24,943 (100.0)	1,622	4,758	31,323
1.6～ (%)	9,636 (91.5)	890 (8.5)	10,526 (100.0)	695	1,976	13,197
1.8～ (%)	3,183 (92.4)	261 (7.6)	3,444 (100.0)	274	659	4,377
2.0～ (%)	1,768 (91.9)	155 (8.1)	1,923 (100.0)	188	377	2,488
合計 (%)	113,540 (87.6)	16,010 (12.4)	129,550 (100.0)	8,865	25,511	163,926
記載なし (%)	7,377 (88.8)	933 (11.2)	8,310 (100.0)	882	5,091	14,283
総計 (%)	120,917 (87.7)	16,943 (12.3)	137,860 (100.0)	9,747	30,602	178,209
平均	1.30	1.25	1.29	1.29	1.29	1.29
標準偏差	0.27	0.25	0.27	0.29	0.27	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査