

表 1619 喫煙の有無 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	269 (89.4)	32 (10.6)	301 (100.0)	25	43	369
0.4～ (%)	5,835 (88.2)	783 (11.8)	6,618 (100.0)	433	1,367	8,418
0.6～ (%)	34,982 (86.6)	5,413 (13.4)	40,395 (100.0)	2,583	7,978	50,956
0.8～ (%)	48,931 (87.8)	6,805 (12.2)	55,736 (100.0)	3,795	10,980	70,511
1.0～ (%)	19,769 (88.8)	2,501 (11.2)	22,270 (100.0)	1,671	4,307	28,248
1.2～ (%)	3,418 (89.2)	414 (10.8)	3,832 (100.0)	324	760	4,916
1.4～ (%)	366 (85.1)	64 (14.9)	430 (100.0)	41	84	555
1.6～ (%)	59 (93.7)	4 (6.3)	63 (100.0)	4	12	79
1.8～ (%)	19 (90.5)	2 (9.5)	21 (100.0)	1	3	25
2.0～ (%)	26 (83.9)	5 (16.1)	31 (100.0)	2	5	38
合計 (%)	113,674 (87.6)	16,023 (12.4)	129,697 (100.0)	8,879	25,539	164,115
記載なし (%)	7,243 (88.7)	920 (11.3)	8,163 (100.0)	868	5,063	14,094
総計 (%)	120,917 (87.7)	16,943 (12.3)	137,860 (100.0)	9,747	30,602	178,209
平均	0.86	0.85	0.86	0.87	0.86	0.86
標準偏差	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査