

表 1620 喫煙の有無 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	現在吸ってい ない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	9,086 (92.1)	780 (7.9)	9,866 (100.0)	671	2,013	12,550
60～ (%)	6,441 (89.1)	786 (10.9)	7,227 (100.0)	482	1,416	9,125
70～ (%)	9,675 (87.1)	1,436 (12.9)	11,111 (100.0)	763	2,080	13,954
80～ (%)	13,563 (86.8)	2,061 (13.2)	15,624 (100.0)	1,040	3,019	19,683
90～ (%)	16,958 (86.0)	2,772 (14.0)	19,730 (100.0)	1,307	3,821	24,858
100～ (%)	18,164 (86.5)	2,838 (13.5)	21,002 (100.0)	1,457	4,136	26,595
110～ (%)	16,477 (87.5)	2,353 (12.5)	18,830 (100.0)	1,267	3,757	23,854
120～ (%)	12,004 (88.0)	1,638 (12.0)	13,642 (100.0)	955	2,741	17,338
130～ (%)	6,685 (88.7)	849 (11.3)	7,534 (100.0)	564	1,510	9,608
140～ (%)	4,555 (90.1)	500 (9.9)	5,055 (100.0)	368	1,026	6,449
合計 (%)	113,608 (87.6)	16,013 (12.4)	129,621 (100.0)	8,874	25,519	164,014
記載なし (%)	7,309 (88.7)	930 (11.3)	8,239 (100.0)	873	5,083	14,195
総計 (%)	120,917 (87.7)	16,943 (12.3)	137,860 (100.0)	9,747	30,602	178,209
平均	98.55	99.68	98.69	99.15	98.86	98.74
標準偏差	26.25	23.25	25.90	26.02	26.24	25.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査