

表 1621 喫煙の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	105 (92.1)	9 (7.9)	114 (100.0)	15	17	146
1.5～ (%)	568 (94.5)	33 (5.5)	601 (100.0)	45	125	771
2.0～ (%)	2,395 (95.0)	125 (5.0)	2,520 (100.0)	201	458	3,179
2.5～ (%)	8,971 (93.2)	656 (6.8)	9,627 (100.0)	684	1,839	12,150
3.0～ (%)	37,244 (90.3)	4,007 (9.7)	41,251 (100.0)	2,793	8,038	52,082
3.5～ (%)	73,629 (87.2)	10,804 (12.8)	84,433 (100.0)	5,974	16,728	107,135
4.0～ (%)	26,768 (84.5)	4,919 (15.5)	31,687 (100.0)	2,273	6,546	40,506
4.5～ (%)	1,535 (81.9)	339 (18.1)	1,874 (100.0)	87	401	2,362
5.0～ (%)	126 (85.7)	21 (14.3)	147 (100.0)	7	18	172
合計 (%)	151,341 (87.9)	20,913 (12.1)	172,254 (100.0)	12,079	34,170	218,503
記載なし (%)	3,934 (88.3)	520 (11.7)	4,454 (100.0)	928	5,086	10,468
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	3.58	3.69	3.60	3.60	3.61	3.60
標準偏差	0.45	0.40	0.44	0.45	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査