

表 1622 喫煙の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	73,257 (87.5)	10,507 (12.5)	83,764 (100.0)	5,972	15,793	105,529
0.2～ (%)	24,526 (87.2)	3,599 (12.8)	28,125 (100.0)	2,121	5,132	35,378
0.5～ (%)	12,529 (87.5)	1,787 (12.5)	14,316 (100.0)	1,061	2,770	18,147
1.0～ (%)	8,317 (89.2)	1,011 (10.8)	9,328 (100.0)	755	1,689	11,772
2.0～ (%)	5,155 (90.0)	574 (10.0)	5,729 (100.0)	469	1,056	7,254
4.0～ (%)	1,830 (90.9)	184 (9.1)	2,014 (100.0)	182	386	2,582
6.0～ (%)	915 (91.1)	89 (8.9)	1,004 (100.0)	80	198	1,282
8.0～ (%)	495 (92.2)	42 (7.8)	537 (100.0)	47	110	694
10.0～ (%)	605 (92.2)	51 (7.8)	656 (100.0)	62	124	842
15.0～ (%)	380 (88.6)	49 (11.4)	429 (100.0)	45	86	560
合計 (%)	128,009 (87.7)	17,893 (12.3)	145,902 (100.0)	10,794	27,344	184,040
記載なし (%)	27,266 (88.5)	3,540 (11.5)	30,806 (100.0)	2,213	11,912	44,931
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	0.65	0.55	0.64	0.72	0.64	0.64
標準偏差	1.97	1.87	1.96	2.08	1.79	1.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査