

表 1623 喫煙の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 透析前補正<br>カルシウム濃度 | 現在吸っていない          | 現在吸っている          | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 7.0未満<br>(%)     | 562<br>(85.5)     | 95<br>(14.5)     | 657<br>(100.0)     | 93     | 124    | 874     |
| 7.0～<br>(%)      | 841<br>(84.6)     | 153<br>(15.4)    | 994<br>(100.0)     | 76     | 196    | 1,266   |
| 7.5～<br>(%)      | 3,245<br>(84.8)   | 582<br>(15.2)    | 3,827<br>(100.0)   | 306    | 838    | 4,971   |
| 8.0～<br>(%)      | 10,930<br>(86.2)  | 1,751<br>(13.8)  | 12,681<br>(100.0)  | 973    | 2,636  | 16,290  |
| 8.4～<br>(%)      | 3,219<br>(86.9)   | 485<br>(13.1)    | 3,704<br>(100.0)   | 260    | 712    | 4,676   |
| 8.5～<br>(%)      | 36,719<br>(87.1)  | 5,418<br>(12.9)  | 42,137<br>(100.0)  | 3,030  | 8,735  | 53,902  |
| 9.0～<br>(%)      | 45,331<br>(87.8)  | 6,290<br>(12.2)  | 51,621<br>(100.0)  | 3,561  | 10,054 | 65,236  |
| 9.5～<br>(%)      | 29,956<br>(88.6)  | 3,843<br>(11.4)  | 33,799<br>(100.0)  | 2,184  | 6,421  | 42,404  |
| 10.0～<br>(%)     | 3,695<br>(88.6)   | 475<br>(11.4)    | 4,170<br>(100.0)   | 295    | 762    | 5,227   |
| 10.1～<br>(%)     | 9,453<br>(89.8)   | 1,078<br>(10.2)  | 10,531<br>(100.0)  | 722    | 2,024  | 13,277  |
| 10.5～<br>(%)     | 4,658<br>(90.5)   | 487<br>(9.5)     | 5,145<br>(100.0)   | 348    | 960    | 6,453   |
| 11.0～<br>(%)     | 1,588<br>(91.5)   | 148<br>(8.5)     | 1,736<br>(100.0)   | 114    | 315    | 2,165   |
| 11.5～<br>(%)     | 530<br>(89.2)     | 64<br>(10.8)     | 594<br>(100.0)     | 56     | 119    | 769     |
| 12.0～<br>(%)     | 410<br>(95.6)     | 19<br>(4.4)      | 429<br>(100.0)     | 32     | 78     | 539     |
| 合計<br>(%)        | 151,137<br>(87.9) | 20,888<br>(12.1) | 172,025<br>(100.0) | 12,050 | 33,974 | 218,049 |
| 記載なし<br>(%)      | 4,138<br>(88.4)   | 545<br>(11.6)    | 4,683<br>(100.0)   | 957    | 5,282  | 10,922  |
| 総計<br>(%)        | 155,275<br>(87.9) | 21,433<br>(12.1) | 176,708<br>(100.0) | 13,007 | 39,256 | 228,971 |
| 平均               | 9.20              | 9.12             | 9.19               | 9.15   | 9.17   | 9.18    |
| 標準偏差             | 0.74              | 0.71             | 0.74               | 0.79   | 0.73   | 0.74    |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査