

表 1624 喫煙の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	6,552 (93.0)	492 (7.0)	7,044 (100.0)	455	1,462	8,961
3.0～ (%)	7,828 (90.5)	826 (9.5)	8,654 (100.0)	517	1,809	10,980
3.5～ (%)	13,442 (89.7)	1,539 (10.3)	14,981 (100.0)	1,038	2,999	19,018
4.0～ (%)	19,791 (88.9)	2,466 (11.1)	22,257 (100.0)	1,562	4,373	28,192
4.5～ (%)	23,510 (88.8)	2,967 (11.2)	26,477 (100.0)	1,834	5,157	33,468
5.0～ (%)	23,373 (88.0)	3,184 (12.0)	26,557 (100.0)	1,853	5,399	33,809
5.5～ (%)	20,066 (87.8)	2,776 (12.2)	22,842 (100.0)	1,642	4,528	29,012
6.0～ (%)	3,366 (87.3)	491 (12.7)	3,857 (100.0)	257	814	4,928
6.1～ (%)	11,113 (86.1)	1,791 (13.9)	12,904 (100.0)	946	2,655	16,505
6.5～ (%)	9,668 (86.1)	1,566 (13.9)	11,234 (100.0)	855	2,288	14,377
7.0～ (%)	5,856 (84.7)	1,061 (15.3)	6,917 (100.0)	532	1,411	8,860
7.5～ (%)	3,515 (83.1)	716 (16.9)	4,231 (100.0)	303	825	5,359
8.0～ (%)	2,039 (81.3)	469 (18.7)	2,508 (100.0)	203	481	3,192
8.5～ (%)	1,256 (79.7)	319 (20.3)	1,575 (100.0)	125	323	2,023
9.0～ (%)	1,904 (77.3)	559 (22.7)	2,463 (100.0)	190	503	3,156
合計 (%)	153,279 (87.8)	21,222 (12.2)	174,501 (100.0)	12,312	35,027	221,840
記載なし (%)	1,996 (90.4)	211 (9.6)	2,207 (100.0)	695	4,229	7,131
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	5.15	5.48	5.19	5.26	5.20	5.20
標準偏差	1.41	1.52	1.42	1.44	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査