

表 1626 喫煙の有無 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満	1,158	135	1,293	70	136	1,499
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
20～	1,422	171	1,593	88	167	1,848
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
35～	1,214	166	1,380	70	163	1,613
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
50～	1,838	263	2,101	127	231	2,459
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
75～	1,586	238	1,824	104	220	2,148
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
100～	1,315	188	1,503	116	168	1,787
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
125～	833	125	958	78	151	1,187
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
150～	21	6	27	5	5	37
(%)	(77.8)	(22.2)	(100.0)			
151～	680	102	782	57	95	934
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
180～	499	63	562	48	56	666
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
210～	323	46	369	41	62	472
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
240～	346	71	417	48	61	526
(%)	(83.0)	(17.0)	(100.0)			
300～	138	24	162	23	20	205
(%)	(85.2)	(14.8)	(100.0)			
350～	102	11	113	6	16	135
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
400～	110	15	125	14	13	152
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
500～	116	19	135	19	12	166
(%)	(85.9)	(14.1)	(100.0)			
合計	11,701	1,643	13,344	914	1,576	15,834
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
記載なし	232	19	251	14	173	438
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
総計	11,933	1,662	13,595	928	1,749	16,272
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
平均	103.21	109.30	103.96	128.48	107.22	105.70
標準偏差	109.35	107.78	109.17	129.39	94.66	109.24

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査