

表 1627 喫煙の有無 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
5未満	198	19	217	17	27	261
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
5～	231	32	263	59	40	362
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
6～	630	85	715	75	152	942
(%)	(88.1)	(11.9)	(100.0)			
7～	2,575	251	2,826	207	545	3,578
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
8～	8,492	896	9,388	690	1,648	11,726
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
9～	26,238	3,267	29,505	2,018	5,515	37,038
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
10～	52,602	6,834	59,436	4,055	11,726	75,217
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
11～	41,848	6,435	48,283	3,493	9,703	61,479
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
12～	15,193	2,353	17,546	1,289	3,535	22,370
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
13～	3,701	690	4,391	288	858	5,537
(%)	(84.3)	(15.7)	(100.0)			
14～	1,247	296	1,543	106	284	1,933
(%)	(80.8)	(19.2)	(100.0)			
合計	152,955	21,158	174,113	12,297	34,033	220,443
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
記載なし	2,320	275	2,595	710	5,223	8,528
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
総計	155,275	21,433	176,708	13,007	39,256	228,971
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
平均	10.66	10.83	10.68	10.67	10.72	10.69
標準偏差	1.27	1.29	1.28	1.35	1.26	1.28

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査