

表 1628 喫煙の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

総コレステロール濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	4,405 (86.4)	693 (13.6)	5,098 (100.0)	385	971	6,454
100～ (%)	12,676 (85.9)	2,079 (14.1)	14,755 (100.0)	1,044	2,821	18,620
120～ (%)	23,539 (86.7)	3,623 (13.3)	27,162 (100.0)	1,902	5,251	34,315
140～ (%)	26,892 (87.4)	3,869 (12.6)	30,761 (100.0)	2,152	5,913	38,826
160～ (%)	22,114 (88.1)	2,985 (11.9)	25,099 (100.0)	1,713	4,771	31,583
180～ (%)	13,810 (88.9)	1,731 (11.1)	15,541 (100.0)	1,054	3,024	19,619
200～ (%)	7,225 (89.5)	848 (10.5)	8,073 (100.0)	532	1,604	10,209
220～ (%)	3,155 (90.2)	343 (9.8)	3,498 (100.0)	248	729	4,475
240～ (%)	1,222 (89.4)	145 (10.6)	1,367 (100.0)	97	269	1,733
260～ (%)	771 (90.9)	77 (9.1)	848 (100.0)	65	198	1,111
合計 (%)	115,809 (87.6)	16,393 (12.4)	132,202 (100.0)	9,192	25,551	166,945
記載なし (%)	39,466 (88.7)	5,040 (11.3)	44,506 (100.0)	3,815	13,705	62,026
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	155.09	151.52	154.65	154.17	155.24	154.71
標準偏差	35.27	34.17	35.15	35.61	35.84	35.28

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査