

表 1629 喫煙の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| HDL-C濃度     | 現在吸っていない          | 現在吸っている          | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 20未満<br>(%) | 473<br>(89.2)     | 57<br>(10.8)     | 530<br>(100.0)     | 52     | 89     | 671     |
| 20～<br>(%)  | 8,860<br>(85.3)   | 1,529<br>(14.7)  | 10,389<br>(100.0)  | 666    | 1,791  | 12,846  |
| 30～<br>(%)  | 25,657<br>(86.2)  | 4,103<br>(13.8)  | 29,760<br>(100.0)  | 1,905  | 5,223  | 36,888  |
| 40～<br>(%)  | 28,708<br>(87.6)  | 4,082<br>(12.4)  | 32,790<br>(100.0)  | 2,107  | 5,832  | 40,729  |
| 50～<br>(%)  | 20,465<br>(88.1)  | 2,767<br>(11.9)  | 23,232<br>(100.0)  | 1,584  | 4,264  | 29,080  |
| 60～<br>(%)  | 11,939<br>(89.0)  | 1,473<br>(11.0)  | 13,412<br>(100.0)  | 923    | 2,457  | 16,792  |
| 70～<br>(%)  | 5,767<br>(88.5)   | 752<br>(11.5)    | 6,519<br>(100.0)   | 436    | 1,246  | 8,201   |
| 80～<br>(%)  | 2,695<br>(89.5)   | 316<br>(10.5)    | 3,011<br>(100.0)   | 223    | 600    | 3,834   |
| 90～<br>(%)  | 1,204<br>(89.9)   | 136<br>(10.1)    | 1,340<br>(100.0)   | 93     | 300    | 1,733   |
| 100～<br>(%) | 938<br>(87.3)     | 136<br>(12.7)    | 1,074<br>(100.0)   | 72     | 312    | 1,458   |
| 合計<br>(%)   | 106,706<br>(87.4) | 15,351<br>(12.6) | 122,057<br>(100.0) | 8,061  | 22,114 | 152,232 |
| 記載なし<br>(%) | 48,569<br>(88.9)  | 6,082<br>(11.1)  | 54,651<br>(100.0)  | 4,946  | 17,142 | 76,739  |
| 総計<br>(%)   | 155,275<br>(87.9) | 21,433<br>(12.1) | 176,708<br>(100.0) | 13,007 | 39,256 | 228,971 |
| 平均          | 48.28             | 46.82            | 48.09              | 48.47  | 49.07  | 48.25   |
| 標準偏差        | 16.40             | 16.11            | 16.37              | 16.43  | 17.47  | 16.54   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査