

表 1630 喫煙の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	1,828 (85.1)	321 (14.9)	2,149 (100.0)	156	411	2,716
50～ (%)	8,827 (85.5)	1,494 (14.5)	10,321 (100.0)	706	1,879	12,906
70～ (%)	19,757 (86.7)	3,032 (13.3)	22,789 (100.0)	1,544	4,199	28,532
90～ (%)	23,686 (87.7)	3,331 (12.3)	27,017 (100.0)	1,712	4,850	33,579
110～ (%)	19,020 (87.8)	2,649 (12.2)	21,669 (100.0)	1,286	3,724	26,679
130～ (%)	11,447 (88.2)	1,536 (11.8)	12,983 (100.0)	814	2,336	16,133
150～ (%)	5,726 (88.7)	733 (11.3)	6,459 (100.0)	419	1,165	8,043
170～ (%)	2,535 (87.9)	350 (12.1)	2,885 (100.0)	181	501	3,567
190～ (%)	954 (86.9)	144 (13.1)	1,098 (100.0)	66	174	1,338
210～ (%)	556 (87.1)	82 (12.9)	638 (100.0)	41	153	832
合計 (%)	94,336 (87.3)	13,672 (12.7)	108,008 (100.0)	6,925	19,392	134,325
記載なし (%)	60,939 (88.7)	7,761 (11.3)	68,700 (100.0)	6,082	19,864	94,646
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	106.79	104.75	106.53	105.34	106.27	106.43
標準偏差	33.15	33.57	33.21	33.50	33.81	33.32

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査