

表 1631 喫煙の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	25 (92.6)	2 (7.4)	27 (100.0)	2	6	35
60～ (%)	201 (94.4)	12 (5.6)	213 (100.0)	16	42	271
80～ (%)	1,739 (92.5)	141 (7.5)	1,880 (100.0)	120	377	2,377
100～ (%)	9,650 (91.8)	867 (8.2)	10,517 (100.0)	709	1,929	13,155
120～ (%)	29,974 (90.0)	3,339 (10.0)	33,313 (100.0)	2,199	6,064	41,576
140～ (%)	45,131 (88.0)	6,135 (12.0)	51,266 (100.0)	3,585	9,352	64,203
160～ (%)	32,061 (86.2)	5,142 (13.8)	37,203 (100.0)	2,699	6,941	46,843
180～ (%)	12,059 (84.1)	2,274 (15.9)	14,333 (100.0)	1,036	2,633	18,002
200～ (%)	2,920 (82.0)	639 (18.0)	3,559 (100.0)	298	658	4,515
220～ (%)	593 (83.8)	115 (16.2)	708 (100.0)	58	128	894
合計 (%)	134,353 (87.8)	18,666 (12.2)	153,019 (100.0)	10,722	28,130	191,871
記載なし (%)	20,922 (88.3)	2,767 (11.7)	23,689 (100.0)	2,285	11,126	37,100
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	150.93	156.20	151.57	152.64	151.66	151.64
標準偏差	23.95	23.80	23.99	24.20	24.08	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査