

表 1632 喫煙の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前拡張期血圧	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	47 (87.0)	7 (13.0)	54 (100.0)	2	11	67
20～ (%)	434 (90.6)	45 (9.4)	479 (100.0)	42	91	612
40～ (%)	12,026 (92.6)	959 (7.4)	12,985 (100.0)	856	2,516	16,357
60～ (%)	64,452 (90.0)	7,195 (10.0)	71,647 (100.0)	4,827	13,151	89,625
80～ (%)	32,332 (86.3)	5,116 (13.7)	37,448 (100.0)	2,653	6,739	46,840
90～ (%)	16,509 (83.6)	3,238 (16.4)	19,747 (100.0)	1,559	3,642	24,948
100～ (%)	7,745 (80.4)	1,891 (19.6)	9,636 (100.0)	725	1,781	12,142
120～ (%)	437 (75.6)	141 (24.4)	578 (100.0)	53	110	741
140～ (%)	36 (75.0)	12 (25.0)	48 (100.0)	1	8	57
合計 (%)	134,018 (87.8)	18,604 (12.2)	152,622 (100.0)	10,718	28,049	191,389
記載なし (%)	21,257 (88.3)	2,829 (11.7)	24,086 (100.0)	2,289	11,207	37,582
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	76.97	81.51	77.52	78.32	77.46	77.56
標準偏差	14.22	14.67	14.35	14.56	14.52	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査