

表 1633 喫煙の有無 透析前脈拍(拍/分)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)	116 (94.3)	7 (5.7)	123 (100.0)	8	24	155
40～ (%)	1,408 (92.1)	120 (7.9)	1,528 (100.0)	120	281	1,929
50～ (%)	11,597 (91.3)	1,102 (8.7)	12,699 (100.0)	873	2,201	15,773
60～ (%)	35,382 (89.9)	3,988 (10.1)	39,370 (100.0)	2,438	6,933	48,741
70～ (%)	41,109 (87.9)	5,685 (12.1)	46,794 (100.0)	2,997	8,393	58,184
80～ (%)	25,098 (85.9)	4,112 (14.1)	29,210 (100.0)	1,894	5,619	36,723
90～ (%)	10,613 (83.3)	2,124 (16.7)	12,737 (100.0)	803	2,378	15,918
100～ (%)	3,228 (82.6)	680 (17.4)	3,908 (100.0)	294	702	4,904
110～ (%)	793 (85.8)	131 (14.2)	924 (100.0)	62	171	1,157
120～ (%)	331 (86.2)	53 (13.8)	384 (100.0)	49	65	498
合計 (%)	129,675 (87.8)	18,002 (12.2)	147,677 (100.0)	9,538	26,767	183,982
記載なし (%)	25,600 (88.2)	3,431 (11.8)	29,031 (100.0)	3,469	12,489	44,989
総計 (%)	155,275 (87.9)	21,433 (12.1)	176,708 (100.0)	13,007	39,256	228,971
平均	74.10	76.91	74.44	74.58	74.77	74.50
標準偏差	12.71	12.98	12.78	13.32	12.72	12.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査