

表 1637 喫煙の有無 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	10,450	1,364	11,814	892	2,370	15,076
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	290	49	339	15	68	422
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	190	24	214	14	56	284
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	263	15	278	12	69	359
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	120	26	146	10	39	195
(%)	(82.2)	(17.8)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,014	113	1,127	81	256	1,464
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
腎硬化症	2,028	264	2,292	110	484	2,886
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
悪性高血圧	200	44	244	15	53	312
(%)	(82.0)	(18.0)	(100.0)			
糖尿病性腎症	8,648	1,596	10,244	686	2,243	13,173
(%)	(84.4)	(15.6)	(100.0)			
SLE腎炎	259	24	283	25	55	363
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
アミロイド腎	42	4	46	3	10	59
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
痛風腎	110	22	132	5	17	154
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	29	3	32	4	8	44
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
腎・尿路結核	15	1	16	2	4	22
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
腎・尿路結石	46	6	52	8	9	69
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	63	5	68	8	9	85
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	48	8	56	4	14	74
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
骨髄腫	13	1	14	2	3	19
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
腎形成不全	62	17	79	7	15	101
(%)	(78.5)	(21.5)	(100.0)			
不明	2,251	332	2,583	245	652	3,480
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
再導入	277	53	330	27	59	416
(%)	(83.9)	(16.1)	(100.0)			
その他	583	85	668	42	179	889
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
合計	27,001	4,056	31,057	2,217	6,672	39,946
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	27,001	4,056	31,057	2,217	6,672	39,946
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査