

表 1643 喫煙の有無 身長(cm)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

身長	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
130未満	29	2	31	3	4	38
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
130～	48	2	50	4	16	70
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
135～	239	5	244	10	35	289
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
140～	918	36	954	54	155	1,163
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
145～	2,293	105	2,398	150	447	2,995
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
150～	3,972	296	4,268	237	707	5,212
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
155～	4,464	488	4,952	316	811	6,079
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
160～	5,046	806	5,852	376	949	7,177
(%)	(86.2)	(13.8)	(100.0)			
165～	4,480	954	5,434	404	884	6,722
(%)	(82.4)	(17.6)	(100.0)			
170～	3,028	813	3,841	290	654	4,785
(%)	(78.8)	(21.2)	(100.0)			
175～	1,139	304	1,443	99	244	1,786
(%)	(78.9)	(21.1)	(100.0)			
180～	281	121	402	35	56	493
(%)	(69.9)	(30.1)	(100.0)			
185～	46	22	68	2	7	77
(%)	(67.6)	(32.4)	(100.0)			
190～	3	5	8		1	9
(%)	(37.5)	(62.5)	(100.0)			
合計	25,986	3,959	29,945	1,980	4,970	36,895
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
記載なし	1,015	97	1,112	237	1,702	3,051
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
総計	27,001	4,056	31,057	2,217	6,672	39,946
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
平均	160.05	165.06	160.72	161.57	160.54	160.74
標準偏差	9.48	8.66	9.53	9.26	9.65	9.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査