

表 1644 喫煙の有無 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満	6	1	7	1	4	12
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
20～	56	6	62	2	12	76
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
30～	2,000	102	2,102	138	442	2,682
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
40～	7,355	617	7,972	499	1,534	10,005
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
50～	8,555	1,306	9,861	694	1,935	12,490
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
60～	5,539	1,068	6,607	510	1,248	8,365
(%)	(83.8)	(16.2)	(100.0)			
70～	2,160	567	2,727	220	476	3,423
(%)	(79.2)	(20.8)	(100.0)			
80～	783	241	1,024	68	181	1,273
(%)	(76.5)	(23.5)	(100.0)			
90～	278	90	368	19	68	455
(%)	(75.5)	(24.5)	(100.0)			
100～	79	27	106	9	27	142
(%)	(74.5)	(25.5)	(100.0)			
110～	36	13	49	2	10	61
(%)	(73.5)	(26.5)	(100.0)			
120～	24	8	32	3	2	37
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
合計	26,871	4,046	30,917	2,165	5,939	39,021
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
記載なし	130	10	140	52	733	925
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
総計	27,001	4,056	31,057	2,217	6,672	39,946
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
平均	55.91	61.71	56.67	57.37	56.15	56.63
標準偏差	12.79	13.68	13.06	12.92	12.91	13.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査