

表 1646 喫煙の有無 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	418 (89.3)	50 (10.7)	468 (100.0)	32	87	587
1.0～ (%)	767 (89.9)	86 (10.1)	853 (100.0)	59	179	1,091
2.0～ (%)	2,134 (88.7)	272 (11.3)	2,406 (100.0)	147	477	3,030
3.0～ (%)	4,895 (89.4)	582 (10.6)	5,477 (100.0)	370	1,046	6,893
4.0～ (%)	6,443 (87.0)	965 (13.0)	7,408 (100.0)	553	1,416	9,377
5.0～ (%)	5,081 (86.4)	800 (13.6)	5,881 (100.0)	403	1,140	7,424
6.0～ (%)	2,473 (83.4)	491 (16.6)	2,964 (100.0)	186	575	3,725
7.0～ (%)	922 (80.9)	217 (19.1)	1,139 (100.0)	71	198	1,408
8.0～ (%)	283 (80.6)	68 (19.4)	351 (100.0)	26	59	436
9.0～ (%)	124 (84.9)	22 (15.1)	146 (100.0)	17	27	190
合計 (%)	23,540 (86.9)	3,553 (13.1)	27,093 (100.0)	1,864	5,204	34,161
記載なし (%)	123 (87.9)	17 (12.1)	140 (100.0)	52	618	810
総計 (%)	23,663 (86.9)	3,570 (13.1)	27,233 (100.0)	1,916	5,822	34,971
平均	4.56	4.84	4.59	4.61	4.57	4.59
標準偏差	1.58	1.61	1.59	1.57	1.57	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査