

表 1647 喫煙の有無 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Body Mass Index	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
14未満	107	13	120	13	16	149
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
14～	741	73	814	55	177	1,046
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
16～	2,942	301	3,243	195	560	3,998
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
18～	5,525	727	6,252	392	970	7,614
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
20～	6,010	877	6,887	438	1,137	8,462
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
22～	4,576	753	5,329	357	885	6,571
(%)	(85.9)	(14.1)	(100.0)			
24～	2,853	503	3,356	229	503	4,088
(%)	(85.0)	(15.0)	(100.0)			
26～	1,470	322	1,792	130	275	2,197
(%)	(82.0)	(18.0)	(100.0)			
28～	787	184	971	54	152	1,177
(%)	(81.1)	(18.9)	(100.0)			
30～	707	150	857	58	102	1,017
(%)	(82.5)	(17.5)	(100.0)			
合計	25,718	3,903	29,621	1,921	4,777	36,319
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
記載なし	1,283	153	1,436	296	1,895	3,627
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
総計	27,001	4,056	31,057	2,217	6,672	39,946
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
平均	21.59	22.37	21.69	21.78	21.48	21.67
標準偏差	3.63	3.76	3.65	3.68	3.58	3.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査