

表 1648 喫煙の有無 透析前BUN(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満	23	4	27	2	10	39
(%)	(85.2)	(14.8)	(100.0)			
20～	214	36	250	16	43	309
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
30～	1,145	193	1,338	78	237	1,653
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
40～	3,269	529	3,798	256	731	4,785
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
50～	5,732	831	6,563	464	1,291	8,318
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
60～	6,084	901	6,985	514	1,305	8,804
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
70～	4,155	629	4,784	314	988	6,086
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
80～	1,982	289	2,271	137	423	2,831
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
90～	734	103	837	55	159	1,051
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
100～	185	32	217	25	37	279
(%)	(85.3)	(14.7)	(100.0)			
110～	41	13	54	4	16	74
(%)	(75.9)	(24.1)	(100.0)			
120～	14	2	16	2	2	20
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
合計	23,578	3,562	27,140	1,867	5,242	34,249
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
記載なし	85	8	93	49	580	722
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
総計	23,663	3,570	27,233	1,916	5,822	34,971
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
平均	62.25	61.95	62.21	62.31	62.33	62.23
標準偏差	15.06	15.46	15.11	14.90	14.99	15.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査