

表 1649 喫煙の有無 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	3 (100.0)		3 (100.0)			3
2～ (%)	116 (97.5)	3 (2.5)	119 (100.0)	3	25	147
4～ (%)	693 (95.6)	32 (4.4)	725 (100.0)	41	152	918
6～ (%)	2,680 (91.8)	240 (8.2)	2,920 (100.0)	219	611	3,750
8～ (%)	6,283 (90.4)	670 (9.6)	6,953 (100.0)	475	1,319	8,747
10～ (%)	7,067 (87.4)	1,021 (12.6)	8,088 (100.0)	535	1,524	10,147
12～ (%)	4,392 (82.9)	904 (17.1)	5,296 (100.0)	352	990	6,638
14～ (%)	1,734 (78.5)	474 (21.5)	2,208 (100.0)	184	428	2,820
16～ (%)	605 (73.5)	218 (26.5)	823 (100.0)	58	167	1,048
合計 (%)	23,573 (86.9)	3,562 (13.1)	27,135 (100.0)	1,867	5,216	34,218
記載なし (%)	90 (91.8)	8 (8.2)	98 (100.0)	49	606	753
総計 (%)	23,663 (86.9)	3,570 (13.1)	27,233 (100.0)	1,916	5,822	34,971
平均	10.58	11.67	10.72	10.82	10.68	10.72
標準偏差	2.61	2.71	2.65	2.65	2.70	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査