

表 1651 喫煙の有無 equilibrated Kt/V(eKt/V)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| equilibrated Kt/V<br>(eKt/V) | 現在吸っていない         | 現在吸っている         | 合計                | 不明    | 記載なし  | 総計     |
|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 0.4未満<br>(%)                 | 14<br>(87.5)     | 2<br>(12.5)     | 16<br>(100.0)     |       | 4     | 20     |
| 0.4～<br>(%)                  | 32<br>(91.4)     | 3<br>(8.6)      | 35<br>(100.0)     | 1     | 8     | 44     |
| 0.6～<br>(%)                  | 233<br>(84.1)    | 44<br>(15.9)    | 277<br>(100.0)    | 10    | 49    | 336    |
| 0.8～<br>(%)                  | 1,435<br>(80.3)  | 351<br>(19.7)   | 1,786<br>(100.0)  | 102   | 323   | 2,211  |
| 1.0～<br>(%)                  | 4,925<br>(83.3)  | 985<br>(16.7)   | 5,910<br>(100.0)  | 452   | 1,140 | 7,502  |
| 1.2～<br>(%)                  | 6,975<br>(86.5)  | 1,093<br>(13.5) | 8,068<br>(100.0)  | 611   | 1,460 | 10,139 |
| 1.4～<br>(%)                  | 5,062<br>(88.8)  | 637<br>(11.2)   | 5,699<br>(100.0)  | 381   | 1,050 | 7,130  |
| 1.6～<br>(%)                  | 2,477<br>(91.4)  | 234<br>(8.6)    | 2,711<br>(100.0)  | 172   | 489   | 3,372  |
| 1.8～<br>(%)                  | 948<br>(92.1)    | 81<br>(7.9)     | 1,029<br>(100.0)  | 68    | 195   | 1,292  |
| 2.0～<br>(%)                  | 678<br>(92.6)    | 54<br>(7.4)     | 732<br>(100.0)    | 37    | 121   | 890    |
| 合計<br>(%)                    | 22,779<br>(86.7) | 3,484<br>(13.3) | 26,263<br>(100.0) | 1,834 | 4,839 | 32,936 |
| 記載なし<br>(%)                  | 884<br>(91.1)    | 86<br>(8.9)     | 970<br>(100.0)    | 82    | 983   | 2,035  |
| 総計<br>(%)                    | 23,663<br>(86.9) | 3,570<br>(13.1) | 27,233<br>(100.0) | 1,916 | 5,822 | 34,971 |
| 平均                           | 1.36             | 1.28            | 1.35              | 1.34  | 1.34  | 1.35   |
| 標準偏差                         | 0.29             | 0.26            | 0.29              | 0.26  | 0.29  | 0.29   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査