

表 1652 喫煙の有無 nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	29	3	32	2	9	43
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
0.4～	776	143	919	48	163	1,130
(%)	(84.4)	(15.6)	(100.0)			
0.6～	6,209	1,019	7,228	507	1,338	9,073
(%)	(85.9)	(14.1)	(100.0)			
0.8～	10,269	1,590	11,859	871	2,150	14,880
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
1.0～	4,586	620	5,206	333	992	6,531
(%)	(88.1)	(11.9)	(100.0)			
1.2～	829	105	934	60	173	1,167
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
1.4～	98	7	105	10	13	128
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
1.6～	5	1	6	4	3	13
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
1.8～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
2.0～	5		5		1	6
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	22,807	3,488	26,295	1,835	4,842	32,972
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
記載なし	856	82	938	81	980	1,999
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
総計	23,663	3,570	27,233	1,916	5,822	34,971
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
平均	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88
標準偏差	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査