

表 1653 喫煙の有無 %クレアチニン産生速度(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	現在吸ってい ない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1,189 (90.8)	120 (9.2)	1,309 (100.0)	77	248	1,634
60～ (%)	965 (86.9)	146 (13.1)	1,111 (100.0)	85	208	1,404
70～ (%)	1,691 (86.1)	272 (13.9)	1,963 (100.0)	150	365	2,478
80～ (%)	2,688 (85.6)	451 (14.4)	3,139 (100.0)	202	527	3,868
90～ (%)	3,480 (85.9)	569 (14.1)	4,049 (100.0)	301	750	5,100
100～ (%)	3,952 (85.4)	674 (14.6)	4,626 (100.0)	335	873	5,834
110～ (%)	3,764 (87.3)	548 (12.7)	4,312 (100.0)	302	785	5,399
120～ (%)	2,642 (86.4)	416 (13.6)	3,058 (100.0)	218	567	3,843
130～ (%)	1,507 (89.7)	173 (10.3)	1,680 (100.0)	98	314	2,092
140～ (%)	923 (88.9)	115 (11.1)	1,038 (100.0)	66	204	1,308
合計 (%)	22,801 (86.7)	3,484 (13.3)	26,285 (100.0)	1,834	4,841	32,960
記載なし (%)	862 (90.9)	86 (9.1)	948 (100.0)	82	981	2,011
総計 (%)	23,663 (86.9)	3,570 (13.1)	27,233 (100.0)	1,916	5,822	34,971
平均	101.90	101.90	101.90	101.76	102.12	101.92
標準偏差	24.05	22.20	23.82	22.76	24.60	23.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査