

表 1654 喫煙の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	7 (87.5)	1 (12.5)	8 (100.0)	1	1	10
1.5～ (%)	42 (84.0)	8 (16.0)	50 (100.0)	5	7	62
2.0～ (%)	223 (93.7)	15 (6.3)	238 (100.0)	20	36	294
2.5～ (%)	1,031 (92.4)	85 (7.6)	1,116 (100.0)	75	201	1,392
3.0～ (%)	6,319 (89.5)	745 (10.5)	7,064 (100.0)	464	1,279	8,807
3.5～ (%)	14,144 (86.5)	2,216 (13.5)	16,360 (100.0)	1,156	3,069	20,585
4.0～ (%)	4,760 (84.0)	908 (16.0)	5,668 (100.0)	365	1,125	7,158
4.5～ (%)	213 (84.2)	40 (15.8)	253 (100.0)	10	54	317
5.0～ (%)	14 (87.5)	2 (12.5)	16 (100.0)		2	18
合計 (%)	26,753 (86.9)	4,020 (13.1)	30,773 (100.0)	2,096	5,774	38,643
記載なし (%)	248 (87.3)	36 (12.7)	284 (100.0)	121	898	1,303
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	3.62	3.70	3.63	3.63	3.65	3.64
標準偏差	0.39	0.37	0.39	0.38	0.39	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査