

表 1655 喫煙の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前CRP濃度	現在吸っていない (%)	現在吸っている (%)	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	14,430 (86.9)	2,183 (13.1)	16,613 (100.0)	1,163	2,928	20,704
0.2～ (%)	4,484 (86.0)	732 (14.0)	5,216 (100.0)	370	891	6,477
0.5～ (%)	2,143 (85.5)	363 (14.5)	2,506 (100.0)	182	485	3,173
1.0～ (%)	1,402 (88.7)	179 (11.3)	1,581 (100.0)	116	306	2,003
2.0～ (%)	780 (87.2)	115 (12.8)	895 (100.0)	62	177	1,134
4.0～ (%)	289 (88.4)	38 (11.6)	327 (100.0)	17	63	407
6.0～ (%)	115 (87.8)	16 (12.2)	131 (100.0)	10	30	171
8.0～ (%)	57 (95.0)	3 (5.0)	60 (100.0)	11	23	94
10.0～ (%)	78 (95.1)	4 (4.9)	82 (100.0)	11	15	108
15.0～ (%)	62 (93.9)	4 (6.1)	66 (100.0)	7	11	84
合計 (%)	23,840 (86.8)	3,637 (13.2)	27,477 (100.0)	1,949	4,929	34,355
記載なし (%)	3,161 (88.3)	419 (11.7)	3,580 (100.0)	268	1,743	5,591
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	0.55	0.47	0.54	0.66	0.58	0.55
標準偏差	1.74	1.49	1.71	2.61	1.62	1.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査