

表 1656 喫煙の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満	89	17	106	40	14	160
(%)	(84.0)	(16.0)	(100.0)			
7.0～	175	39	214	11	34	259
(%)	(81.8)	(18.2)	(100.0)			
7.5～	659	97	756	55	140	951
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
8.0～	1,930	344	2,274	163	431	2,868
(%)	(84.9)	(15.1)	(100.0)			
8.4～	556	92	648	54	116	818
(%)	(85.8)	(14.2)	(100.0)			
8.5～	6,351	1,001	7,352	535	1,414	9,301
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
9.0～	8,034	1,228	9,262	599	1,654	11,515
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
9.5～	5,329	712	6,041	413	1,158	7,612
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
10.0～	596	97	693	50	160	903
(%)	(86.0)	(14.0)	(100.0)			
10.1～	1,720	243	1,963	122	367	2,452
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
10.5～	859	96	955	35	180	1,170
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
11.0～	283	39	322	11	50	383
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
11.5～	102	8	110	4	18	132
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
12.0～	56	6	62	3	6	71
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
合計	26,739	4,019	30,758	2,095	5,742	38,595
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
記載なし	262	37	299	122	930	1,351
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
総計	27,001	4,056	31,057	2,217	6,672	39,946
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
平均	9.20	9.14	9.19	9.07	9.19	9.19
標準偏差	0.74	0.73	0.74	0.87	0.72	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査