

表 1657 喫煙の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
3未満	836	78	914	62	157	1,133
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
3.0～	1,112	135	1,247	90	237	1,574
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
3.5～	2,033	246	2,279	139	431	2,849
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
4.0～	3,189	422	3,611	237	717	4,565
(%)	(88.3)	(11.7)	(100.0)			
4.5～	3,987	532	4,519	325	868	5,712
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
5.0～	4,292	597	4,889	332	913	6,134
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
5.5～	3,659	564	4,223	280	796	5,299
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
6.0～	668	96	764	55	131	950
(%)	(87.4)	(12.6)	(100.0)			
6.1～	2,214	328	2,542	189	513	3,244
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
6.5～	1,885	348	2,233	148	425	2,806
(%)	(84.4)	(15.6)	(100.0)			
7.0～	1,158	241	1,399	126	250	1,775
(%)	(82.8)	(17.2)	(100.0)			
7.5～	728	161	889	58	157	1,104
(%)	(81.9)	(18.1)	(100.0)			
8.0～	420	99	519	42	90	651
(%)	(80.9)	(19.1)	(100.0)			
8.5～	280	64	344	22	57	423
(%)	(81.4)	(18.6)	(100.0)			
9.0～	396	130	526	50	106	682
(%)	(75.3)	(24.7)	(100.0)			
合計	26,857	4,041	30,898	2,155	5,848	38,901
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
記載なし	144	15	159	62	824	1,045
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
総計	27,001	4,056	31,057	2,217	6,672	39,946
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
平均	5.31	5.63	5.35	5.43	5.35	5.36
標準偏差	1.40	1.55	1.42	1.47	1.42	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査