

表 1659 喫煙の有無 PTH値(pg/mL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	191 (86.8)	29 (13.2)	220 (100.0)	6	23	249
20~ (%)	241 (91.6)	22 (8.4)	263 (100.0)	7	31	301
35~ (%)	218 (90.8)	22 (9.2)	240 (100.0)	4	30	274
50~ (%)	343 (89.3)	41 (10.7)	384 (100.0)	7	53	444
75~ (%)	296 (89.4)	35 (10.6)	331 (100.0)	8	52	391
100~ (%)	260 (88.7)	33 (11.3)	293 (100.0)	7	31	331
125~ (%)	174 (86.1)	28 (13.9)	202 (100.0)	5	27	234
150~ (%)	3 (75.0)	1 (25.0)	4 (100.0)			4
151~ (%)	167 (90.3)	18 (9.7)	185 (100.0)	7	23	215
180~ (%)	105 (85.4)	18 (14.6)	123 (100.0)	2	12	137
210~ (%)	75 (89.3)	9 (10.7)	84 (100.0)	6	8	98
240~ (%)	74 (94.9)	4 (5.1)	78 (100.0)	1	9	88
300~ (%)	31 (83.8)	6 (16.2)	37 (100.0)		5	42
350~ (%)	27 (96.4)	1 (3.6)	28 (100.0)		1	29
400~ (%)	17 (81.0)	4 (19.0)	21 (100.0)		3	24
500~ (%)	37 (90.2)	4 (9.8)	41 (100.0)	2	2	45
合計 (%)	2,259 (89.1)	275 (10.9)	2,534 (100.0)	62	310	2,906
記載なし (%)	8 (88.9)	1 (11.1)	9 (100.0)		22	31
総計 (%)	2,267 (89.1)	276 (10.9)	2,543 (100.0)	62	332	2,937
平均	112.54	112.54	112.54	118.68	104.27	111.79
標準偏差	111.29	101.73	110.27	109.71	88.10	108.12

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査