

表 1660 喫煙の有無 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
5未満	19	2	21	3	2	26
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
5～	13	5	18	12	1	31
(%)	(72.2)	(27.8)	(100.0)			
6～	85	10	95	10	9	114
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
7～	331	34	365	28	52	445
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
8～	1,163	146	1,309	103	225	1,637
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
9～	4,132	510	4,642	325	883	5,850
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
10～	8,876	1,341	10,217	686	2,044	12,947
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
11～	7,988	1,195	9,183	643	1,751	11,577
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
12～	2,978	523	3,501	242	639	4,382
(%)	(85.1)	(14.9)	(100.0)			
13～	782	168	950	64	171	1,185
(%)	(82.3)	(17.7)	(100.0)			
14～	344	88	432	27	64	523
(%)	(79.6)	(20.4)	(100.0)			
合計	26,711	4,022	30,733	2,143	5,841	38,717
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
記載なし	290	34	324	74	831	1,229
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
総計	27,001	4,056	31,057	2,217	6,672	39,946
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
平均	10.82	10.99	10.84	10.79	10.84	10.84
標準偏差	1.26	1.30	1.27	1.35	1.19	1.26

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査