

表 1661 喫煙の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

総コレステロール濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	709 (86.9)	107 (13.1)	816 (100.0)	46	130	992
100～ (%)	1,985 (84.3)	370 (15.7)	2,355 (100.0)	174	459	2,988
120～ (%)	3,884 (85.3)	667 (14.7)	4,551 (100.0)	288	855	5,694
140～ (%)	4,745 (85.5)	805 (14.5)	5,550 (100.0)	356	999	6,905
160～ (%)	4,202 (87.3)	613 (12.7)	4,815 (100.0)	303	893	6,011
180～ (%)	2,751 (88.9)	344 (11.1)	3,095 (100.0)	176	602	3,873
200～ (%)	1,595 (89.4)	190 (10.6)	1,785 (100.0)	124	344	2,253
220～ (%)	697 (90.6)	72 (9.4)	769 (100.0)	37	150	956
240～ (%)	282 (90.7)	29 (9.3)	311 (100.0)	20	53	384
260～ (%)	138 (86.8)	21 (13.2)	159 (100.0)	7	50	216
合計 (%)	20,988 (86.7)	3,218 (13.3)	24,206 (100.0)	1,531	4,535	30,272
記載なし (%)	6,013 (87.8)	838 (12.2)	6,851 (100.0)	686	2,137	9,674
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	158.57	153.63	157.91	156.55	159.00	158.00
標準偏差	35.80	33.95	35.60	34.81	36.48	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査