

表 1662 喫煙の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	54 (79.4)	14 (20.6)	68 (100.0)	1	12	81
20～ (%)	1,264 (84.5)	232 (15.5)	1,496 (100.0)	74	304	1,874
30～ (%)	4,119 (84.0)	786 (16.0)	4,905 (100.0)	338	888	6,131
40～ (%)	5,135 (86.4)	807 (13.6)	5,942 (100.0)	341	1,077	7,360
50～ (%)	4,227 (87.9)	580 (12.1)	4,807 (100.0)	272	892	5,971
60～ (%)	2,742 (88.4)	360 (11.6)	3,102 (100.0)	195	560	3,857
70～ (%)	1,424 (88.8)	180 (11.2)	1,604 (100.0)	89	330	2,023
80～ (%)	731 (88.5)	95 (11.5)	826 (100.0)	39	148	1,013
90～ (%)	298 (84.9)	53 (15.1)	351 (100.0)	21	59	431
100～ (%)	256 (87.1)	38 (12.9)	294 (100.0)	26	63	383
合計 (%)	20,250 (86.6)	3,145 (13.4)	23,395 (100.0)	1,396	4,333	29,124
記載なし (%)	6,751 (88.1)	911 (11.9)	7,662 (100.0)	821	2,339	10,822
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	51.08	49.20	50.83	50.84	51.02	50.85
標準偏差	17.04	17.46	17.11	17.74	17.42	17.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査