

表 1663 喫煙の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	362 (84.8)	65 (15.2)	427 (100.0)	25	77	529
50～ (%)	1,608 (83.6)	316 (16.4)	1,924 (100.0)	127	352	2,403
70～ (%)	3,555 (85.9)	583 (14.1)	4,138 (100.0)	242	758	5,138
90～ (%)	4,383 (86.4)	691 (13.6)	5,074 (100.0)	261	930	6,265
110～ (%)	3,584 (87.1)	533 (12.9)	4,117 (100.0)	228	817	5,162
130～ (%)	2,282 (88.9)	286 (11.1)	2,568 (100.0)	106	475	3,149
150～ (%)	1,125 (87.6)	159 (12.4)	1,284 (100.0)	67	246	1,597
170～ (%)	486 (88.2)	65 (11.8)	551 (100.0)	26	105	682
190～ (%)	180 (90.0)	20 (10.0)	200 (100.0)	11	51	262
210～ (%)	96 (88.1)	13 (11.9)	109 (100.0)	2	30	141
合計 (%)	17,661 (86.6)	2,731 (13.4)	20,392 (100.0)	1,095	3,841	25,328
記載なし (%)	9,340 (87.6)	1,325 (12.4)	10,665 (100.0)	1,122	2,831	14,618
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	107.54	103.91	107.05	104.04	108.34	107.12
標準偏差	33.32	32.86	33.28	32.18	34.10	33.37

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査