

表 1664 喫煙の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
60～ (%)	87 (92.6)	7 (7.4)	94 (100.0)	6	15	115
80～ (%)	457 (92.9)	35 (7.1)	492 (100.0)	43	80	615
100～ (%)	2,060 (90.4)	219 (9.6)	2,279 (100.0)	140	381	2,800
120～ (%)	5,472 (88.9)	680 (11.1)	6,152 (100.0)	406	1,081	7,639
140～ (%)	7,963 (87.3)	1,159 (12.7)	9,122 (100.0)	640	1,671	11,433
160～ (%)	5,545 (85.1)	974 (14.9)	6,519 (100.0)	478	1,311	8,308
180～ (%)	2,015 (81.7)	452 (18.3)	2,467 (100.0)	184	503	3,154
200～ (%)	523 (81.5)	119 (18.5)	642 (100.0)	45	135	822
220～ (%)	139 (81.8)	31 (18.2)	170 (100.0)	11	35	216
合計 (%)	24,263 (86.8)	3,676 (13.2)	27,939 (100.0)	1,953	5,212	35,104
記載なし (%)	2,738 (87.8)	380 (12.2)	3,118 (100.0)	264	1,460	4,842
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	149.63	155.26	150.37	151.08	152.08	150.67
標準偏差	25.00	24.96	25.06	24.65	25.02	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査