

表 1665 喫煙の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

| 透析前拡張期血圧    | 現在吸っていない         | 現在吸っている         | 合計                | 不明    | 記載なし  | 総計     |
|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 20未満<br>(%) | 3<br>(75.0)      | 1<br>(25.0)     | 4<br>(100.0)      | 1     | 2     | 7      |
| 20～<br>(%)  | 85<br>(94.4)     | 5<br>(5.6)      | 90<br>(100.0)     | 11    | 20    | 121    |
| 40～<br>(%)  | 2,023<br>(92.1)  | 174<br>(7.9)    | 2,197<br>(100.0)  | 125   | 358   | 2,680  |
| 60～<br>(%)  | 10,631<br>(88.9) | 1,324<br>(11.1) | 11,955<br>(100.0) | 804   | 2,213 | 14,972 |
| 80～<br>(%)  | 6,160<br>(86.5)  | 962<br>(13.5)   | 7,122<br>(100.0)  | 500   | 1,381 | 9,003  |
| 90～<br>(%)  | 3,492<br>(83.2)  | 705<br>(16.8)   | 4,197<br>(100.0)  | 327   | 793   | 5,317  |
| 100～<br>(%) | 1,672<br>(78.8)  | 451<br>(21.2)   | 2,123<br>(100.0)  | 170   | 408   | 2,701  |
| 120～<br>(%) | 95<br>(73.1)     | 35<br>(26.9)    | 130<br>(100.0)    | 14    | 25    | 169    |
| 140～<br>(%) | 6<br>(66.7)      | 3<br>(33.3)     | 9<br>(100.0)      | 2     | 1     | 12     |
| 合計<br>(%)   | 24,167<br>(86.8) | 3,660<br>(13.2) | 27,827<br>(100.0) | 1,954 | 5,201 | 34,982 |
| 記載なし<br>(%) | 2,834<br>(87.7)  | 396<br>(12.3)   | 3,230<br>(100.0)  | 263   | 1,471 | 4,964  |
| 総計<br>(%)   | 27,001<br>(86.9) | 4,056<br>(13.1) | 31,057<br>(100.0) | 2,217 | 6,672 | 39,946 |
| 平均          | 78.43            | 83.01           | 79.03             | 80.37 | 79.47 | 79.17  |
| 標準偏差        | 14.54            | 14.99           | 14.68             | 15.12 | 14.65 | 14.70  |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査